

คำแนะนำในการให้วัคซีนสำหรับเด็กไทย

- ท่านจะได้รับคำแนะนำจากกุมารแพทย์ว่า บุตรหลานของท่านควรได้รับวัคซีนชนิดใดตามวัย และรับทราบผลข้างเคียงที่อาจพบได้ภายหลังฉีดวัคซีน เพื่อสามารถวางแผนดูแลบุตรหลานให้ได้รับวัคซีนครบถ้วนและดูแลอย่างเหมาะสม

- การฉีดวัคซีนปียี่สิบสี่เพื่อป้องกันวันโรค โดยทั่วไปเด็กทุกรายจะได้รับเมื่อแรกเกิดบริเวณไหล่ซ้าย ภายหลังฉีดจะไม่มีแผล ต่อมาประมาณ 3-4 สัปดาห์ จะเห็นเป็นตุ่มแดงบริเวณที่ฉีด ถ้าตุ่มบวมแดงมาก อาจมีลักษณะคล้ายตุ่มหนองและบางครั้งอาจแตก ให้เช็ดผิวแห้งบริเวณนั้น ให้สะอาดและแห้งเสมอด้วยน้ำต้มสุก ตุ่มนี้จะค่อยๆแห้งลง และกลายเป็นแผลเป็นภายใน 3-6 สัปดาห์

- หลังการฉีดวัคซีนบางชนิด เด็กอาจมีไข้ตัวร้อน ประมาณ 1 วัน ควรเช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาจนไข้ลง และให้ยาลดไข้ตามที่แพทย์สั่ง


- วัคซีนบางชนิดที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง (เข็มกระตุ้น) ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามนัดหมายทุกครั้ง เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันโรคอย่างเต็มที่

- หากครบกำหนดรับวัคซีน แต่บุตรหลานเป็นไข้หรือเจ็บป่วยควรเลื่อนการรับวัคซีนจนกว่าอาการป่วยดีขึ้น

- ในกรณีที่ไม่สามารถไปรับวัคซีนตามนัด ควรพาไปรับวัคซีนให้ครบทันทีที่มีโอกาส ไม่เว้นระยะห่างนาน โดยสามารถให้เข็มต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ หรือสามารถปรึกษากับกุมารแพทย์ ก่อนการรับวัคซีนแต่ละชนิด

- ถ้ามีอาการรุนแรงหลังฉีดวัคซีน เช่น ชัก ไข้สูง ควรแจ้งให้กุมารแพทย์ทราบก่อนการฉีดครั้งต่อไป

***** วัคซีนตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขสามารถรับฟรี โดยไม่เสียค่าบริการ ตามศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานพยาบาลต้นสังกัดของโครงการ “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติถ้วนหน้า” *****



สนใจสอบถามรายละเอียด

คลินิกกุมารเวชกรรม

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

โทร. 0-2849-6600 ต่อ 1120,1121

นอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ)

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.

โทร. 0-2849-6600 ต่อ 2160,2164



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกเด็กสุขภาพดี Well Baby Clinic

จัดทำโดย แผนกกุมารเวชกรรม

ตุลาคม 2566



ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย แนะนำโดย สมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย 2566

อายุ	วัคซีนพื้นฐานตามช่วงวัย และวัคซีนเสริม	รายชื่อวัคซีนและราคาโดยประมาณ
แรกเกิด	วัคซีนโรค บิซีจี และตับอักเสบบี # 1	
1 เดือน	ตับอักเสบบี # 2 (กรณีมารดาเป็นพาหะ)	Heberbiovac-HB 195 บาท
2 เดือน	- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์-โพลีโอสชนิดฉีด อีบ-ตับอักเสบบี #1 - โรว์ต้าหยอด #1 (Rotarix) - วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ไอพีดี #1	- Infanrix-hexa 1,415 บาท (วัคซีนรวม 6 โรค) - Rotarix 883 บาท - Prevnar 13 สายพันธุ์ 2,337 บาท - Synflorix 10 สายพันธุ์ 1,662 บาท
4 เดือน	- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์-โพลีโอสชนิดฉีด อีบ-ตับอักเสบบี #2 หรือคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์-โพลีโอส ชนิดฉีด-อีบ #2 - โรว์ต้าหยอด #2 (Rotarix) - วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ไอพีดี #2	- Infanrix-hexa 1,415 บาท (วัคซีนรวม 6 โรค) - Pentaxim 1,179 บาท (วัคซีนรวม 5 โรค) - Rotarix 883 บาท - Prevnar 13 สายพันธุ์ 2,337 บาท - Synflorix 10 สายพันธุ์ 1,662 บาท
6 เดือน	- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์-โพลีโอสชนิดฉีดอีบ-ตับอักเสบบี #3 - วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ไอพีดี #3 - ไขหวัดใหญ่ (ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ในครั้งแรก) - วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก สายพันธุ์ EV71 (ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน อายุ 6 เดือน - 5 ปี 11 เดือน)	- Infanrix-hexa 1,415 บาท (วัคซีนรวม 6 โรค) - Prevnar 13 สายพันธุ์ 2,337 บาท - Synflorix 10 สายพันธุ์ 1,662 บาท - Fluarix tetra (4 สายพันธุ์) 246 บาท - Entrovac 2,697 บาท
9 เดือน	หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม #1	MMR II 356 บาท
12 เดือน	- ไขสมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็น #1 - วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ไอพีดี #4	- CD JE VAX 427 บาท - Prevnar 13 สายพันธุ์ 2,337 บาท - Synflorix 10 สายพันธุ์ 1,662 บาท
13 เดือน	- อีสุกอีใส (ฉีดในเด็กอายุ > 1 ปี, ฉีด 2 เข็มห่าง>3 เดือน) - ตับอักเสบบี ชนิดเชื้อตาย (ฉีด 2 เข็มห่างกัน 6- 12เดือน)	- Varivax 795 บาท - Healive 529 บาท
18 เดือน	- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์-โพลีโอสชนิดฉีด-อีบ #4 - หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน #2	- Pentaxim 1,179 บาท - MMR II 356 บาท
2 ปี	ไขสมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็น #2	CD JE VAX 427 บาท
4-6 ปี	คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์-โพลีโอสชนิดฉีด #5	Tetraxim 909 บาท
9-14 ปี	- กระตุ้นคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (อายุ 11-12 ปี) - เอชพีวี 4 สายพันธุ์ (ฉีดได้ทั้งเด็กหญิงและชาย อายุ 9- 14 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 - 12 เดือน) - เอชพีวี 9 สายพันธุ์ (ฉีดได้ทั้งเด็กหญิงและชาย อายุ 9- 14 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 - 12 เดือน)	- Boostagen 643 - Gardasil (4 สายพันธุ์) 2,326 บาท - Gardasil (9 สายพันธุ์) 5,593 บาท

*หมายเหตุ ราคาที่ระบุไว้เป็นราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาวัคซีนในท้องตลาดและชนิดที่มีในท้องยาของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 26 ก.ค. 66 *

** วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ดูคำแนะนำในการฉีดตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย **